



مراقبت های بعد از عمل هیسترکتومی (آموزش به مددجو)

بیمارستان و زایشگاه بنت الهی
گمیمه آموزش به بیمار
منع پرسنلاری پرورش سودارث



- بطور مرتب راه بروید.
- به مدت ۳ هفته رانندگی نکنید.
- اشیاء سنگین تراز یک ۴/۵ کیلوگرم را بلند نکنید.
- کارهای سبک منزل بلامانع است.
- برای بالا و پایین آمدن از پله از پزشک خود سوال کنید.
- از کارهای سنگین منزل و ورزش هایی چون وزنه زدن، دو و پیاده روی سنگین که سبب تنفس سخت می شود بپرهیزید.

تفاہی پس از عمل

- به مدت ۳ روز از خوردن غذاهای نفخ چون حبوبات، پلو و خورش، میوه خام، سبزیجات خام، آب میوه خام و آب میوه های صناعی مثل سن ایچ و ... بپرهیزید.

▪ سعی کنید غذاهای سبک در حجم کم مصرف کنید.

▪ وعده های میان غذا سالم در طول روز داشته باشید.

▪ آب به میزان فراوان مصرف کنید. حداقل ۸ لیوان در روز تا از بیوست جلوگیری نماید.

▪ برای جلوگیری از بیوست از رونگ زیتون، آلو و انجیر خشک خیس کرده استفاده نماید.

BENTOLHODA HOSPITAL

BENTOLHODA HOSPITAL

۹) بیسکریری از سایر بیماری ها

بعد از هیسترکتومی احتمال ایجاد سرطان تخمدان بسیار کمتر از افراد دیگر که هیسترکتومی نشده اند می باشد و اگر دهانه رحم کاملاً برداشته شده باشد فقط معاینه سالانه جهت بررسی از عدم وجود سرطانهای خود واژن - ولو (ناحیه تناسلی خارجی) و نیز تخمدان بعمل می آید.


۱۰) کیفیت زندگی

خارج نمودن رحم اصولاً نباید تاثیری در کیفیت زندگی و فعالیت جنسی زنان داشته باشد و در صورت هر گونه نگرانی و یا مشکلی حتماً باید با پزشک معالج خود مشورت نمایید.

۱۱) مراقبت های بعد از عمل

بعد از عمل در صورت وجود هر کدام از علائم زیر باید به پزشک خود اطلاع دهید: تب، درد شکم، عدم دفع گاز و مدفوع، تهوع و استفراغ طول کشیده، خونریزی واژینال، طپش قلب و افت شدید فشارخون، اسهال، ترشحات بدبو از محل زخم یا واژن، بیرون زدگی توده (فتق) از محل عمل، درد پهلوها، وجود خون در ادرار، کاهش حجم ادرار و هر گونه درد شکم شدید (گاهی آپاندیستیت در دوره بعد از عمل با درد ناشی از عمل اشتباه می شود).

بیمارستان و زایشگاه Bent al-Hodai



۴) استحمام

استحمام از روز دوم بعد از عمل و بلا فاصله بعد از برداشتن پاتسمن پس از روزانه (بصورت دوش) انجام می گیرد و بهتر است بعد از حمام محل زخم با ششوار کاملاً خشک شود.

۵) مصرف عسکن

در بیشتر موارد زلوفن، مفنامیک اسید، شیاف مقعدی دیکلوفناک و همچنین داروهای لازم جهت بیبود نفخ و بیوست بیمار تجویز می گردد.

۶) نزدیکی جنسی

تا چهار تا شش هفته بعد از عمل باید از مقاربت جنسی اجتناب گردد.

۷) پیشگیری از پوکی استخوان

در صورت برداشته شدن هر دو تخمدان بلا فاصله چند روز بعد از عمل علائم یائسگی مانند گرفتگی و تعریق و ... مشاهده می شود که معمولاً پیاده روی و مصرف کلسیم برای جلوگیری از پوکی استخوان توصیه می شود و از داروهای هورمونی مگر در صورت نیاز شدید استفاده نمی شود.

۸) پیگیری آزمایش پاتولوژی

جواب پاتولوژی حتماً باید به پزشک معالج نشان داده شود تا از عدم وجود بیماری بدخیم و ... اطمینان حاصل گردد.

مددجوی عزیز:

با سلام و آزوی سلامت برای شما، امیدواریم از لحظاتی که در کنار شما بودیم (ضایعه کافی داشته باشید و هر چه سریعتر به آغوش فانهاده و چامنه بازگردید، این پمپلت آموزش هفت افزایش اطلاعات شما در مورد این غذایی بعد از عمل و پیشگیری از عوارض آن در افتیار شما قرار گرفته است).

۱) مرابت از محل زخم

چه در روش باز یعنی (لایپاراتومی) و چه در روش بسته (لایپاروسکوپی) محل زخم باید حتماً خشک نگهداشته شود تا از رشد میکروب ها جلوگیری شود. پاسمنان روی زخم بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت برداشته می شود و زخم باز و خشک نگهداشته می شود.

وجود پاسمنان مرتبط از رسیدن هوا به زخم جلوگیری نموده و محیط را به علت وجود گرمای و رطوبت جهت رشد میکروب ها مساعد می سازد. معمولاً بخیه ها خود به خود جذب می شوند و اگر قابل جذب نباشند بعد از یک هفته می توان آن را کشید.

ترشحات آبکی و خون آلود در افراد چاق ممکن است از محل زخم وجود داشته باشد که معمولاً با رعایت همین نکات بهبود می یابد.

۲) مصرف آنتی بیوتیک

امروزه با تجویز آنتی بیوتیک در اتاق عمل و قبل از شروع جراحی می توان از بروز عفونت پیشگیری نمود و حتی دیگر نیازی به تجویز آنتی بیوتیک به بیمار نمی باشد. (مگر در موارد خاص).

۳) استراحت

اگر شکم باز شده باشد تا شش هفته باید از فعالیت سنگین اجتناب شود و در موارد لایپاروسکوپی هیچ گونه استراحتی معمولاً به بیمار داده نمی شود و بعد از چند روز تا یک هفته می تواند در محل کار خود حاضر شود.



آدرس : مشهد ، خیابان بهار

تلفن : ۰۵۱۳۸۵۹۰۵۱ - ۵

www.bentolhodahospital@yahoo.com

کanal تلگرامی : @benthospital