



بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

فرم آموزش های ارائه شده به بیمار در زمان ترخیص توسط پزشک

(عمل جراحی واریکوسل)

Date of Admission: تاریخ پذیرش:		Ward: بخش:	Name: نام:	Unit Number: شماره پرونده:
Attending Physician: پزشک معالج:		Room: اتاق:	Date of Birth: تاریخ تولد:	Family Name: نام خانوادگی:
		Bed: تخت:	Father's Name: نام پدر:	

آموزش های زمان ترخیص توسط پزشک				
نحوه ارائه آموزش	نحوه صحیح مصرف دارو	میزان و مدت زمان مصرف	نام دارو	
چهره به چهره و مکتوب				آموزش دارو
چهره به چهره و مکتوب				
چهره به چهره و مکتوب				
چهره به چهره و مکتوب				
چهره به چهره و مکتوب				
چهره به چهره و مکتوب	رژیم معمولی کم نمک و کم چرب و سبک و پرهیز از مصرف غذاهای نفاخ مانند سیر و پیاز خام، حبوبات و آب میوه های مصنوعی و داشتن اجابت مزاج نرم - مصرف مایعات کافی		تغذیه	
چهره به چهره و مکتوب	- پانسمان محل عمل بصورت روز درمیان در درمانگاه تعویض نمائید پس از..... روز می توانید پس از مشورت با پزشک خود استحمام کنید.		مراقبت از زخم، محل جراحی و عضو آسیب دیده	
چهره به چهره و مکتوب	- تورم و کبودی شدید کیسه بیضه - درد و حساسیت روبه افزایش محل عمل - تب بیشتر از 38 درجه		علائم هشدار (پیگیری های پس از ترخیص)	
چهره به چهره و مکتوب	- به مدت 2 هفته لباس زیر تنگ بپوشید - عدم فعالیت سنگین تا یک ماه - در صورت داشتن نمونه آسیب شناسی پیگیری جواب آن و ارائه به پزشک معالج - بین 7-10 روز پس از عمل جهت کشیدن بخیه محل عمل به مطب مراجعه کنید - درباره انجام فعالیت جنسی با پزشک معالج خود مشورت کنید معمولاً تا یکماه نزدیکی جنسی نداشته باشید. - جهت آزمایش اسپرموگرام (آزمایش منی) 3 ماه بعد از عمل به مطب مراجعه نمائید.		سایر موارد آموزشی	

اینجانب تأیید می نمایم که آموزش های فوق را دریافت نموده ام.

امضاء یا اثر انگشت بیمار یا همراه بیمار



بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

فرم آموزش های ارائه شده به بیمار در زمان ترخیص توسط پرستار

(عمل جراحی واریکوسل)

Unit Number: شماره پرونده:		
Date of Admission: تاریخ پذیرش:	Ward: بخش:	Name: نام:
	Room: اتاق:	Family Name: نام خانوادگی:
Attending Physician: پزشک معالج:	Bed: تخت:	Date of Birth: تاریخ تولد:
		Father's Name: نام پدر:

آموزش های زمان ترخیص توسط پرستار					
نحوه ارائه آموزش	نحوه صحیح مصرف دارو	میزان و مدت زمان مصرف			نام دارو
		صبح	ظهر	شب	
چهره به چهره و مکتوب					آموزش دارو
چهره به چهره و مکتوب	قبل از غذا 9 بعد از غذا 9 همراه غذا 9 ناشتا 9 موقع خواب 9 با آب زیاد 9				
چهره به چهره و مکتوب	قبل از غذا 9 بعد از غذا 9 همراه غذا 9 ناشتا 9 موقع خواب 9 با آب زیاد 9				
چهره به چهره و مکتوب	قبل از غذا 9 بعد از غذا 9 همراه غذا 9 ناشتا 9 موقع خواب 9 با آب زیاد 9				
چهره به چهره و مکتوب	قبل از غذا 9 بعد از غذا 9 همراه غذا 9 ناشتا 9 موقع خواب 9 با آب زیاد 9				
چهره به چهره و مکتوب		رژیم معمولی کم نمک و کم چرب و سبک و پرهیز از مصرف غذاهای نفاخ مانند سیر و پیاز خام، حبوبات و آب میوه های مصنوعی و داشتن اجابت مزاج نرم - مصرف مایعات کافی			تغذیه
چهره به چهره و مکتوب		- پانسمان محل عمل بصورت روز درمیان در درمانگاه تعویض نمائید پس از روز می توانید پس از مشورت با پزشک خود استحمام کنید.			مراقبت از زخم، محل جراحی و عضو آسیب دیده
چهره به چهره و مکتوب		- تورم و کیودی شدید کیسه بیضه - درد و حساسیت روبه افزایش محل عمل - تب بیشتر از 38 درجه			علائم هشدار (پیگیری های پس از ترخیص)
چهره به چهره و مکتوب		- به مدت 2 هفته لباس زیر تنگ بپوشید - عدم فعالیت سنگین تا یک ماه - در صورت داشتن نمونه آسیب شناسی پیگیری جواب آن و ارائه به پزشک معالج - بین 7- 10 روز پس از عمل جهت کشیدن بخیه محل عمل به مطب مراجعه کنید - درباره انجام فعالیت جنسی با پزشک معالج خود مشورت کنید معمولاً تا یکماه نزدیکی جنسی نداشته باشید. - جهت آزمایش اسپرموگرام (آزمایش منی) 3 ماه بعد از عمل به مطب مراجعه نمائید.			سایر موارد آموزشی

اینجانب تائید می نمایم که آموزش های فوق را دریافت نموده ام.