

عوارض جانبی

عوارض جانبی این داروها نادر است. سرفه های خشک در ابتدا مصرف این دارو ممکن دیده شود که پس از مدتی از بین می رود، در صورتی که برطرف نشد، با پزشک برای تغییر میزان یا نوع دارو مشورت کنید. احساس سرگیجه نیز در ابتدای مصرف دارو کاملا طبیعی است و تنها نکته ای که باید در نظر گرفته شود، توجه در هنگام بلند شدن از تخت خواب است که باعث افتادن و صدمه نشود.




نکاتی که باید در هنگام استفاده از این داروها در نظر گرفته شود:

از مصرف همزمان این داروها با ایبوپروفن (Motrin)، Advil)، آسپرین و ناپروکسن (Aleve) خودداری کنید و قبل از آن با پزشک مشورت کنید. در صورتی که از داروهای دیگر مانند داروهای بدون نسخه پزشک، دیورتیک ها (مدرها)، قرص های پتاسیم و یا مکمل های گیاهی و غذایی، استفاده می کنید، پزشک را در جریان قرار دهید. این داروها در زمان حاملگی و شیردهی منع مصرف دارد.



مددجوی عزیز:

باسلام و آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم از لمظاتی که در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید. این پمفلت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد علائم و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است.





عنوان سند: **کاهنده فشار خون**

شماره سند: BH-P- 143- شماره ویرایش: 00 شماره بازنگری: 00 تاریخ
تدوین: اردیبهشت 98



داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (کاهنده فشار خون)

(آموزش به مددجو)

کمیته آموزش به بیمار

بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

منبع: nlm.nih.gov/medlineplus

آدرس: مشهد - فیابان بهار

اینستاگرام: Zayeshgah.bentolhoda

Bentolhoda-hospital-maternity

و کلام آخر
در صورتی که زبان و لب های شما متورم شد،
سریعا به مراکز اورژانس مراجعه کنید، زیرا
شما دچار واکنش های حساسیتی جدی این
داروها شده اید، که بسیار نادر است.



برخی از عوارض جانبی دیگر

سردرد
احساس خستگی
از دست دادن اشتها
ناراحتی معده
اسهال
بی حسی
تب
خارش پوست یا تاول
درد مفاصل

