

والدین عزیز:

با سلام و آرزوی سلامتی برای فرزند دل‌بندتان، امیدواریم از خدماتی که به شما ارائه نموده ایم رضایت کافی داشته باشید. این مطلب آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در رابطه با مراقبت‌های لازم پس از جراحی فرزندتان تهیه شده است.

انواژیناسیون چیست؟

به معنای در هم رفتن قسمتی از روده به درون قسمت مجاور خود است. سن شیوع آن ۳ ماهگی تا ۲ سالگی است در پسرها بیشتر از دخترها رخ می‌دهد و در فصل بهار و پاییز شیوع بیشتری دارد. تاکنون علت آن شناخته نشده است.

مراقبت از کودک

- از دادن مایعات از راه دهان خودداری کنید.
- اگر کودک مدفوع طبیعی با رنگ قهوه‌ای دارد نشانه برطرف شدن خود به خودی در هم رفتگی روده است که باید سریعاً به پرستار و پزشک اطلاع دهید.

در این بیماری مدفوع به شکل ژله‌ای و بلغمی می‌شود که یکی از مشخصه‌های بیماری است.

- ممکن است پزشک انجام جراحی را لازم نداند و ابتدا از روش‌های دیگری مثل کاهش فشار (ریداکشن) جهت برگرداندن روده‌ها به حالت طبیعی استفاده کند.

- ریداکشن در واحد رادیولوژی و توسط پزشک رادیولوژی انجام می‌شود. ابتدا سرم نرمال سالین از مقعد کودک وارد روده‌ها شده و همزمان سونوگرافی انجام میشود.

- روز بعد سونوگرافی کنترل انجام شده و در صورت عدم پاسخ به ریداکشن، کودک جهت بردن به اتاق عمل آماده می‌شود.

- پس از انجام اقدامات مورد نیاز (کاهش فشار) مایعات صاف شروع شده سپس به تدریج رژیم غذایی بر حسب تحمل شروع می‌شود.

- در صورتیکه کاهش فشار (بدون انجام جراحی) موفقیت‌آمیز نباشد کودک را باید برای جراحی شکم آماده نمود.

آمادگی برای جراحی شکم

- لازم است کودک چند ساعت قبل از عمل ناشتا باشد.
- پرستار و یا پزشک زمان رفتن کودک به اتاق عمل را به شما خواهند گفت.
- وسایل فلزی مانند زیورآلات، گیره‌های فلزی مو و... را خارج نمایید.
- صبح روز جراحی، باید لباس مخصوص اتاق عمل را به کودک بپوشانید



عنوان سند: انواژیناسیون

شماره سند: ۱۹۰- BH-P- شماره ویرایش: ۰۰ شماره
بازنگری: ۰۰ تاریخ تدوین: آذر ۱۳۹۹



انواژیناسیون (درهم رفتگی روده ها)

بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

آدرس: مشهد- فیابان بهار

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۵۹۰۰۵۱ دافلی ۳۱۳

منبع:

www.nur si ngconsul t .com

بیمارستان بنت الهدی

اینستاگرام: Zayeshgah.bentolhoda


Bentolhoda-hospital-maternity

• زمانی که لازم باشد پرستار به شما می گوید که کودک اجازه راه رفتن دارد؛ به کودک برای راه رفتن و انجام فعالیت های سبک کمک کنید.

از انجام فعالیت های سنگین توسط کودک جلوگیری کنید و به او اجازه شنا و ورزش های سنگین را ندهید تا بهبودی کامل حاصل شود

بهتر است کودک در حالت خوابیده به پهلو یا به پشت استراحت کند تا فشار وارده بر شکم کاهش یابد.

• از دست کاری محل جراحی خودداری کنید زیرا ممکن است باعث عفونت زخم شود.



مراقبت های پس از عمل

• پس از عمل نوعی سوند از طریق بینی کودک در معده گذاشته می شود که به آن سوند معده می گویند که به یک کیسه متصل است و ترشحات خارج شده از معده در آن جمع می شوند. کیسه باید پایین تر از سطح بدن و بدون تماس با زمین باشد.

• مسیر سوند معده نباید تا خوردگی داشته باشد.

• اگر کودک با وجود داشتن سوند معده استفراغ کرد به پرستار اطلاع دهید.

• پس از عمل تا برگشت فعالیت روده کودک نباید چیزی از راه دهان بخورد.

• اگر نفخ شکم و استفراغ کودک برطرف شد سوند برداشته می شود و شما می توانید مایعات صاف شده به کودک بدهید و پس از آن با نظر پزشک می توان شیر مادر یا شیرخشک به او داد.

