

والدین عزیز:

باسلام و آرزوی سلامتی برای فرزند دلبندتان، امیدواریم از خدماتی که به شما ارائه نموده ایم رضایت کافی داشته باشید. این مطلب آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در رابطه با مراقبت های لازم پس از جراحی فرزندتان تهیه شده است.

هرنی (فتق) چیست؟

فتق زمانی اتفاق می افتد که لایه های درونی عضله شکمی ضعیف شده و اعضاء شکمی به این دیواره ضعیف شده فشار آورده و یک کیسه بادکنک مانند درست می کند. فتق ممکن است ایجاد دردهای بسیار شدید کند و با بروز مشکلات جدی دیگر ممکن است نیاز به جراحی اورژانس پیدا کند.

در اطفال بروز هرنی در ناحیه **کشاله ران** و در ناحیه **ناف** شایع می باشد که به اولی فتق رانی و به دومی فتق نافی می گویند.

تشخیص

- تشخیص فتق معمولاً ساده است.
- فتق کشاله ران به صورت تورم یا برآمدگی در کشاله ران است که در زمان گریه کودک یا خم شدن ممکن است بیشتر نمایان می شود همچنین در زمان آرام بودن کودک، دراز کشیدن یا با وارد آوردن فشار آهسته ممکن است به عقب برگردد و یا کوچکتر شود.
- این فتق معمولاً همراه با درد است که ممکن است شدید باشد یا درد خفیفی که در طول روز شدت پیدا می کند.

درمان

- بیشتر فتق های غیر افتاده را می توان به درون حفره شکمی برگردانید این کار بهتر است توسط پزشک و بعد از آرام کردن کودک صورت گیرد، در یک کودک مضطرب شاید لازم شود بعد از تجویز دارویی خواب آور این کار را انجام شود.
- اگر نتوان فتق را با فشار به درون حفره شکمی برگردانید باید عمل جراحی اورژانس انجام شود.
- بهتر است در ساعات اولیه پذیرش کودک در وضعیت خوابیده به پشت قرار گیرد به طوریکه سر به سمت پایین و پاها بالا باشد.

مراقب های بعد از عمل

- نیاز است ۲۴ بعد عمل، محل جراحی با پانسمان پوشیده باشد. مراقب باشید که پوشک کودک با ناحیه عمل تماس نداشته باشد.
- شروع رژیم بعد از عمل طبق دستور پزشک از یک تا ۲۴ ساعت بعد متغییر است.
- در آغوش گرفتن کودک پس از جراحی طوری که ناحیه عمل تحت فشار نباشد، مانعی ندارد.
- در صورتی که کودک درد داشته باشد می توان از داروهای تجویز شده (شیاف استامینوفن) استفاده نمود.
- در بیماران پسر بعد از عمل ناحیه بیضه ها کمی متورم می شود که طبیعی است.
- ۷-۱۰ روز بعد از عمل برای مشاهده بخیه ها به درمانگاه مراجعه کنید.
- بعد از کشیدن بخیه ها می توانید محل زخم را با آب و صابون ملایم غیر التهابی شستشو دهید و به آرامی خشک کنید.
- اگر داروی چرک خشک کن برای کودک تجویز شده است، دارو را به طور منظم و کامل به کودک بدهید.



عنوان سند: فتق رانی

شماره سند ۱۹۳: BH-P- شماره ویرایش: ۰۰ شماره بازنگری: ۰۰ تاریخ تدوین: آبان ۱۳۹۹



(فتق رانی)

بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

آدرس: مشهد- فیابان بهار

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۵۹۰۰۵۱ داخلی ۲۵۳

منبع:

www.nursingconsult.com

بیمارستان بنت الهدی


اینستاگرام: Zayeshgah.bentolhoda

Bentolhoda-hospital-maternity

در صورت بروز علائم زیر به پزشک مراجعه

کنید:

- درد شدید
- خونریزی زیاد از محل برش جراحی
- مشکل در تنفس
- سردرد خفیف که بعد از چند روز رفع نشود.
- لرز و یا تب بیشتر از ۳۸,۵
- قرمزی، گرمی و یا خروج چرک از محل جراحی
- تورم یا درد ناحیه بیضه که به مرور بدتر شود.



تغذیه

داروهای ضد درد ممکن است باعث یبوست شوند بنابراین باید غذاهای پر فیبر (سبزیجات، میوه ها) و مایعات کافی به کودک داده شود.

داروهای چرک خشک کن ممکن است باعث ایجاد اسهال شوند، در اینصورت می توانید از ماست یا دوغ برای کودک استفاده نمایید.

کودک باید به مدت یک هفته از انجام بازی های سنگین مانند پریدن، دویدن، شنا کردن اجتناب کند.

