

بیمارستان و زایشگاه

Bentehospital



ضمن آرزوی سلامتی امیدواریم مطالعه این پمفت آموزشی در افزایش آگاهی شما جهت آشنایی و پیشگیری از عوارض مفید باشد.

اگر:

- در سن بالای ۴۵ سال هستید.
- دارای اضافه وزن و یا چاقی هستید
- زنانی که سندروم تخمدان پلی کیستیک دارند.
- افراد غیر فعال با فعالیت بدنی کم.

افراد مسن

اهمیت تشخیص و درمان مرحله پیش از دیابت :

دیابت یک روزه به سراغ شما نمی آید، لذا هر چه این بیماری را زودتر تشخیص دهید در درمان آن موفق تر خواهد بود.
با آزمایش استاندارد خون می توانید به این بیماری پی ببرید و از عوارض خطرناک این بیماری مانند بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کنید.

درمان مرحله پیش از دیابت :

از یک رژیم غذایی مناسب برای حفظ سلامت قلب پیروی کنید و وزن خود را کاهش دهید.



اگر چه اغلب پیش از دیابت هیچ علایم خاصی ندارند ولی ممکن است برخی از علایم دیابت در آنها دیده شود مانند:
تشنجی های غیر طبیعی، تکرر ادرار، تاری دید و خستگی های بیش از حد یک بررسی بالینی ممکن است برخی از نشانه های احتمالی ابتلا به مرحله پیش دیابت را نشان دهد.

بیمار یابی:

چه کسانی باید برای مرحله پیش از دیابت آزمایش خون بدنهند:
در صورتیکه هر کدام از شرایط زیر را داشته باشد.

آدرس : مشهد ، خیابان بهار
تلفن : ۰۵۱-۸۵۹۰۵۱

www.bentolhodahospital@yahoo.com
کانال تلگرامی : @benthospital

استعمال دخانیات را ترک کنید.

چربی و فشار خون بالای خود را درمان کنید.

توصیه های اساسی برای کنترل پیش از دیابت:

در وضعیت پیش از دیابت قند خون افزایش می یابد اما به اندازه ای نمی رسد که بتوان آن را به عنوان دیابت در نظر گرفت ولی این بدین معنا نیست که وضعیت پیش از دیابت بی ضرر است چرا که احتمال زیاد به دیابت منجر خواهد شد و از هم اکنون یک خطر برای سلامت قلب شما می باشد، مرحله پیش از دیابت یک خطر همیشگی برای سلامت آینده شما به حساب می آید لذا از هم اکنون باید برای بهبود آن تلاش کنید و صبر نکنید تا اوضاع بدتر شود.

بر روی اصلاح سبک زندگیتان تمرکز کنید:

- کاهش وزن : هفته ای ۵ مرتبه و هر مرتبه

BENTOLHODA HOSPITAL

۶۰-۳۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط را انجام دهید.

- رژیم غذایی کم چرب و حاوی فیبر کافی را مصرف نمایید.

- برای کاهش فشار خون می بایست نمک دریافتی تان را کاهش دهید.

- از مصرف مشروبات الکی به طور جدی پرهیز نمایید.

- سطوح کلسترول (چربی) و فشار خون خود را کاهش دهید

اگر اصلاح الگوی زندگی برای کاهش خطر دیابت و بیماری قلبی کفایت کنند. دارو درمانی می تواند مفید باشد اما در کنار دارو درمانی رعایت الگوی زندگی سالم مفید می باشد.

جدول قند خون و دیابت

| | |
|----------------|---------------------------|
| ۱۱۰ و پایین تر | قند ناشتا نرمال |
| ۱۳۹ و پایین تر | ۲ ساعت بعد از غذا |
| ۱۰۰-۱۲۵ | قند ناشتا در پیش از دیابت |
| ۱۴۰-۱۹۹ | ۲ ساعت بعد از غذا |
| ۱۳۶ و بالاتر | قندناشتا در دیابت |
| ۲۰۰ و بالاتر | ۲ ساعت بعد از غذا |

مرحله پیش از دیابت

(آموزش به مددجو)

بیمارستان و زایشگاه بنت الهادی
کمیته آموزش به بیمار

منبع : سایت up to date

