




## حاملگی خارج از رحم (EP)

حاملگی خارج از رحم وضعیتی اورژانسی است که به بمب ساعتی معروف است و تقریباً در یک یا دو درصد بارداری‌ها اتفاق می‌افتد شایع ترین مکان که حاملگی خارج رحم رخ می‌دهد لوله‌های رحمی هستند که از تخدمان به رحم کشیده شده‌اند. حاملگی خارج رحمی ممکن است در مکان‌های مختلفی مانند تخدمان، گردن رحم یا کاملاً خارج از دستگاه تناسلی فرد و خارج از حفره رحم اتفاق بیافتد و به همین دلیل به حاملگی خارج رحمی، حاملگی لوله‌ای نیز گفته می‌شود..

علانیمی که در صورت ایجاد باید به پزشک مراجعه کرد

raig ترین شکایت حاملگی خارج رحمی درد شکمی است شدت درد متغیر است و ممکن است یک طرفه یا دوطرفه، در قسمت تحتانی شکم احساس شود.

در حاملگی لوله‌ای به جای آن که جنین در رحم جای بگیرد. در لوله‌های رحمی گیرافتاده و در آنجا رشد می‌کند. به این دلیل که لوله‌های رحمی گنجایش بزرگ‌شدن جنین را ندارد. در یک زمان نامعلوم لوله‌های رحمی بدلیل فشار پاره می‌شود و نوعی خونریزی غیر قابل کنترل در شکم رخ می‌دهد. اگر ظرف چند ساعت بیمار به اورژانس مراجعه نکند احتمال مرگ وی به دلیل خونریزی داخلی وجود دارد.



مدددجوی عزیز:

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم از لحظاتی که در کنار شما هستیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید. این پمفت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد عمل جراحی شما، رژیم غذایی و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است.

### تشخیص

تشخیص حاملگی خارج رحمی توسط پزشک براساس علائم بالینی، اندازه‌گیری هورمون BHCG سونوگرافی صورت می‌گیرد.

### درمان

در مصوبتی که احتمال قوی به حاملگی خارج رحمی داده شود، باتوجه به شرایط بیمار و پیشرفت حاملگی، جراحی انجام می‌شود.  
درمان طبی در موارد خاص، با دارو و کنترل دقیق علائم بالینی و حیاتی، در بیمارستان قابل انجام است.

**مراقبت‌های پس از عمل و حین ترمیم لپاراتومی یا لپاراسکوپی EP**  
۱- پس از عمل، مدت زمان بستره در بخش باتوجه به وضعیت بیمار و نظر پزشک می‌باشد.

۲- بهتر است حداقل ۲۴ ساعت پس از عمل، با نظر پزشک معالج (به همراه پرستار برای اولین بار) از تخت پایین آمده و راه بروید. راه رفتن را به طور مرتب انجام دهید.

۳- بهتر است حداقل هر ۲ ساعت یکبار نفس عمیق بکشید و سرفه کنید. این حرکت تاحدود زیادی از عفووت ریه‌ها جلوگیری می‌کند. برای پیشگیری از هرگونه ناراحتی در هنگام سرفه، می‌توانید محل عمل را نگه دارید.





بیمارستان وزایشگاه  
 Bent al-Hadi



## حاملگی خارج از رحم (EP)

آموزش به مددجو  
کمیته آموزش به بیمار

- ۹- طبق دستور پزشک معالج چند روز بعد از عمل ، با در دست داشتن برگه خلاصه پرونده و پس از دریافت جواب پاتولوژی از آزمایشگاه،جهت ویزیت مجدد و کشیدن بخیه ها به پزشک معالج مراجعه فرماید.
- ۱۰- بعد از عمل در صورت مشاهده هر کدام از علائم زیر حتماً به پزشک خود و در مسیر دسترسی به اورژانس زنان مراجعه نمایید.تب ، لرز ، درد شدید شکم عدم دفع گاز ، عدم اجابت مزاج تهوع استفراغ طول کشنه.خون ریزی شدید واژینال ، نفخ شکم ، ورم پاتنگی نفس ، ترشحات بدبو از محل زخم یا واژن ، قرمزی ، داغی در اطراف محل زخم ، تورم در محل زخم و دفع لخته از واژن
- ۱۱- مادران با گروه خونی منفی با همسران گروه خونی مشبت باید آمپول رگام دریافت کنند.



منبع: سایت up to date  
پرستاری بروز - سودارت

BENTOLHODA HOSPITAL

۴- مراقبت از محل زخم :  
 محل زخم چه در روش باز (laparatomie) و چه در روش بسته (laparoscopie) باید خشک نگه داشته شود. تعویض پانسمان محل زخم با دستور پزشک انجام گیرد.

۵- پس از ترخیص کلیه داروهای تجویز شده جهت منزل، از قبیل: آنتی بیوتیک، مسکن و غیره را طبق دستور پزشک و بطور صحیح (میزان، فواصل زمانی ، تعداد کافی) مصرف نماید.

۶- انجام کارهای شخصی و سبک در منزل مانع ندارد.  
۷- سه روز بعد از عمل می توانید بصورت روزانه استحمام نمایید(ابتدا با تایید پزشک) ولی در هر صورت رعایت بهداشت فردی الزامی می باشد.

۸- از خوردن غذایهای ناخ همچون حبوبات،شیر،میوه های خام،آبیوه های صناعی ..... خودداری کنید و سعی کنید غذاهای سبک در حجم کم و غنی از پروتئین مصرف کنید. مصرف آب به میزان فراوان بسیار مفید است.