

بیمارستان و زایشگاه

Bent Al-Hodah



مددجوی غریز:

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم از لحظاتی که در کنار شما بودیم فضایت کافی داشته باشید و هر چه سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید. این پمفت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد بیماری و پیشکاری از عواطف آن در اختیار شما قرار گرفته است.

کورتاژ:

باز کردن دهانه‌ی رحم و تخلیه‌ی نسج آن را گویند. این عمل یکی از شایع ترین عمل‌های زنان است، می‌تواند برای تشخیص یا درمان خون‌ریزی‌های غیر طبیعی زنان به کار رود.

خون‌ریزی غیر طبیعی زنان چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خون‌ریزی غیر طبیعی از واژن (مهبل) گردد. خون‌ریزی غیر طبیعی به خون‌ریزی گفته می‌شود که در زمانی خارج از انتظار ما اتفاق بیافتد.

موارد خون‌ریزی غیر طبیعی زنان:

- عمل کورتاژ ضمن می‌هوشی عمومی یا بی‌حسی ناحیه‌ای انجام می‌شود برای دسترسی آسان به رحم شمارا در وضعیت مناسبی قرار می‌دهند.
- ابتدا دهانه رحم را متسع (باز) می‌کنند، در صورتیکه علت خون‌ریزی سقط است، محصولات حاملگی را خارج می‌نمایند و اگر علت خون‌ریزی نامعلوم است از بافت دهانه‌ی رحم و رحم نمونه (بیوپسی) بر می‌دارند.
- اگر پزشک شما ناحیه‌ی مشکوکی را یافت، او ممکن است یک بخش یا همه‌ی آن را خارج کند و جهت پاتولوژی بفرستند. یک آسیب شناس بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش می‌کند، تا سرطان یا دیگر بیماری‌های احتمالی را تشخیص دهد.
- توجه داشته باشید عمل کورتاژ هیچ تاثیری در روند زندگی شماندارد و میتوانید بعد از یک هفته استراحت، بدون هیچ مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.

آدرس: مشهد، خیابان بهار

www.bentolhodahospital@yahoo.com



کورتاز

(آموزش به مددجو)

بیمارستان و زایشگاه بنت الهی
کمیته آموزش به بیمار
منبع: زنان میلر - ویلیامز

Zayeshgah.bentolhoda
Bentolhoda-hospital-maternity

	عنوان سند: کورتاز
شماره سند: BH-P ۱۷۸	- شماره پیرایش: ۰۱ - شماره بازنگری: ۰۱
تاریخ تدوین: ۹۵/۰۶/۰۵	تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۹۹

- در صورت نیاز برای جبران کم خونی خود قرص های آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت ۳ ماه استفاده نمایید.
- ملاقات مجدد با پزشک خود داشته باشید و جواب نمونه را به اطلاع دهید.

در موارد زیر لازم است به پزشک خود مراجعه نمایید:

- ۱- تب
- ۲- ترشحات زیاد و غیر طبیعی
- ۳- درد زیاد در قسمت زیرشکم
- ۴- افزایش خون ریزی
- ۵- ترشحات بد بو
- ۶- هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی، ضعف، بی حالی وغیره

BENTOLHODA HOSPITAL

آموزش بعد از عمل:

- بعد از عمل از انجام کارهای سنگین و برداشتن اجسام سنگین خودداری کنید.
- به مدت ۴ هفته از تماس جنسی خودداری کنید.
- در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا ۳ماه به تأخیر اندازید تا حرم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیم گیری برای بارداری مجدد حتما تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود.
- ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نمایید.
- بعد از کورتاز از غذاهای سرشار از آهن (مانند: گوشت قرمز ، جگر، تخم مرغ ، غلات: سبزیجات دارای برگ تیره و به ویژه اسفناج ، جعفری ، کلم بروکلی ، حبوبات به ویژه عدس ، کشمش سبز) استفاده نموده و از مصرف چای و لبنیات همراه با غذاهای پروتئینی اجتناب شود و به جای آن منابع ویتامین سی مانند گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای و مرکبات همراه با غذای پروتئین مصرف شود.