



بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

مددجوی عزیز:

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم از لحظاتی که در کنار شما هستیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید. این پمفلت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد عمل جراحی شما، و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است.

پاراتیروئیدکتومی (برداشتن غده پاراتیروئید)

غدد پاراتیروئید چهار غده کوچک در اطراف غده تیروئید است که مسئول تنظیم سطح کلسیم خون می باشد. در صورت افزایش فعالیت این غدد کلسیم خون افزایش یافته و مشکلات متعدد گوارشی، قلبی، ضعف عضلانی و در موارد شدید پوکی استخوان را منجر خواهد شد.

اگر در اسکن هسته ای و یا سونوگرافی غده پاراتیروئید مبتلا مشخص شود جراحی به صورت کم تهاجمی صورت گرفته و غده مبتلا خارج خواهد شد.

اگر اسکن هسته و یا سونوگرافی منفی باشد لازم است که هر چهار غده در دو طرف تیروئید بررسی شود تا غده و یا غدد مبتلا پیدا گردد.

در بعضی از موارد ممکن است جراحی موفقیت آمیز نبوده و نتوانیم غده مبتلا را پیدا نماییم.

افزایش فعالیت غدد پاراتیروئید در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه شایع می باشد که در موارد خاص به جراحی نیاز خواهند داشت.

مراقبت های پس از جراحی پاراتیروئید

در موارد جراحی کم تهاجمی معمولا نیاز به درن نیست و بخیه ها روز هفتم قابل کشیدن است.

بعد از خروج غده مبتلا شرایط هورمونی در بدن معکوس شده و ظرف ساعت اولیه و یا روز های اول و دوم بعد از جراحی ممکن است افت شدید کلسیم اتفاق بیفتد. این وضعیت در مواردی که بیمار قبل از عمل پوکی استخوان شدید داشته باشد بیشتر دیده می شود که حالت استخوان گرسنه نامیده می شود.



افت کلسیم در بیماران دیالیزی و یا پیوند کلیه شدیدتر است.

لازم است برای جلوگیری از علائم افت کلسیم بعد از جراحی کلسیم خوراکی شروع شود. در موارد شدید افت کلسیم ممکن است نیاز به دریافت کلسیم تزریقی باشد.

مصرف لبنیات و شیر نیز در کاهش علائم می تواند مفید باشد.

برای کاهش درد می توانید از مسکن هایی نظیر استامینوفن و یا بروفن استفاده نمایید.

به علت کوتاه بودن زمان عمل و دستکاری محدود در روش جراحی کم تهاجمی پس از ترخیص انتی بیوتیک نیاز نیست.

لازم است پس از جراحی تا زمان طبیعی شدن عوارض پرکاری پاراتیروئید نظیر پوکی استخوان تحت نظر فوق تخصص غدد درون ریز باشد.



آدرس: مشهد، خیابان بهار
تلفن: ۵ - ۵۱۳۸۵۹۰۰۵۱

 Zayeshgah.bentalhoda

www.Bent-hospital.com



بیمارستان وز ایشگاه
بنت الهدی



BENTOLHODA HOSPITAL



پاراتیروئیدکتومی
(برداشتن غده پاراتیروئید)

آموزش به مددجو
کمیته آموزش به بیمار



عنوان سند: پاراتیروئیدکتومی

شماره سند: BN-PA-134 - شماره ویرایش: 1
شماره بازنگری: 1 - تاریخ تدوین: بهمن 97



منبع: سایت up to date
پرستاری برون-سودارت