



تغذیه با شیر مادر در مادران شیرده

مشکوک به کرونا ویروس

شماره سند: ۱۷۷ BH-P-۰۰

شماره بازنگری: ۰۰ تاریخ تدوین: اردیبهشت ۹۹



تغذیه با شیر مادر در مادران شیرده قطعی و مشکوک به ویروس کرونا

بیمارستان وزایشگاه بنت الهدی

(آموزش به مددجو)

کمیته آموزش به بیمار

منبع: دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید (nCoV-2019)


آدرس: مشهد - خیابان بهار

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۵۹۰۰۵۱

Zayeshgah.bentolhoda@
ایستگاره
Bentolhoda-hospital-maternity

بیمارستان بنت الهدی

- در صورتی که جداسازی و قراردادن نوزاد در اتاق دیگر به دلایلی امکان پذیر نباشد نوزاد باید حدائق از مادر ۲ متر فاصله داشته باشد و یک پرده از سقف تا پایین بین مادر و نوزاد قرار داده شود.
- جدایی تا زمان رفع هر گونه شک یا احتمال ابتلای مادر باید تداوم یابد.
- بهتر است مادر یک همراه سالم آموزش دیده داشته باشد که مراقبت های مربوط به نوزاد رالجام دهد. همراه باید اصول بهداشت فردی و پیشگیرانه (مانند شستشوی مکرر دست ها یا آب و صابون مایع و در صورت نبودن صابون مواد ضدعفونی کننده با پایه حدائق) عذر صد الکل، زدن ماسک...) را رعایت نماید.
- در صورت عدم امکان حضور همراه، مراقبت های نوزادی باید توسط کارکنان بخش صورت پذیرد.



شیر مادر یافته نشده است. انتقال فرد به فرد شیبیه به آنفولانزا و سایر عوامل بیماری‌زای تنفسی (نظیر مرس و سارس) عمده از طریق قطرات تنفسی ایجاد می‌شود که در سرفه یا عطسه فرد مبتلا وجود دارد.

تماس مادر و شیرخوار

- در مادران با ابتلای قطعی، محتمل یا مشکوک، برای کاهش خطر انتقال ویروس از مادر به نوزاد، لازم است موارد زیر رعایت شود:
 - از برقراری تماس پوست با پوست بین نوزاد تازه متولد شده و مادر مبتلای قطعی، محتمل یا مشکوک ممانعت به عمل آید.
 - هرنوزادی که از مادر ابتلای قطعی COVID19 به دنیا می‌آید و هم چنین شیرخوار مادر با ابتلای قطعی، باید مشکوک تلقی و ملاحظات مربوط به موارد مشکوک درباره آنها رعایت گردد. این نوزادان اشیرخواران باید دوهفته قرنطینه شوند.
 - در صورتی که مادر محتمل یا مشکوک به ابتلای COVID19 باشد، نوزاد باید به طور موقت از وی جدا شود و در اتاق دیگری توسط همراه سالم نگهداری شود.
 - خطرات و فواید این جدایی موقت باید برای مادر توضیح داده شود.

کرونا ویروس ها (CORONAVIRUSES):

خانواده بزرگی از ویروس ها و زیرمجموعه کرونا ویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری های شدیدتری همچون سارس ، مرس و کووید۱۹ را شامل می شود.

کرونا ویروس ها در سال ۱۹۶۵ کشف شدند و مطالعه بر روی آنها به طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی داشت این ویروس به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می کند ، با این حال تاکنون هفت کروناویروس انسانی کشف شده است. آخرین نوع آنها ، در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر ووهان چین با همه گیری در انسان شیوع پیدا کرد.

تغذیه نوزاد و شیرخوار در مادران شیوده مشکوک و یا مبتلا به کرونا

مادر باید هنگام مراقبت از نوزاد ، اقدامات احتیاطی را برای پیشگیری از انتقال ویروس به شیرخوار (از جمله شستن دستها قبل از لمس شیرخوار و داشتن ماسک.....) رعایت نماید.

تغذیه با شیر مادر

- اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی بد است ، به طور موقت ، تغذیه شیرخوار با شیر انسانی (ذخیره شده در بانک شیر) یا شیر مصنوعی انجام گیرد. با بهبود حال عمومی باید شیر مادر با رعایت اصول بهداشتی دوشیده ، ذخیره و مورد استفاده قرار گیرد.

- اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی خوب است، تغذیه با شیر دوشیده شده مادر انجام گیرد. برای این کار مادر باید شیر خود را با استفاده از شیر دوش دستی یا برقی بدوشد. مادر باید دست های خود را قبل از لمس هر قسمت پمپ یا ظرف ذخیره سازی شیر بشود. بعد از هرنوبت شیر دوشی تمام اجزای شیر دوش که با پستان و دست مادر در تماس بوده باید طبق دستور العمل شیر دوش ، شسته یا ضد عفونی شود.
- تغذیه شیرخوار مادر مورد مشکوک / محتمل با رعایت اصول بهداشتی از پستان مادر منع ندارد.

ملاحظات مربوط به بانک شیر

تا به حال شواهدی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از شیر مادر گزارش نشده است و فرآیند پاستوریزاسیون روی شیر مادر آن را امن می نماید.

برای پیشگیری از هرگونه انتقالی چه از طریق شیر و چه از طریق ظروف، توصیه می شود:

- مادران مبتلای قطعی ، مشکوک یا محتمل شیر اهدا نکنند.
- به اهدا کنندگان تاکید گردد قبل از شروع فرآیند شیر دوشی، دست های خود را مطابق با دستور العمل با آب و صابون یا شوینده مناسب با دقت و کامل بشوینند.

- کارشناس بانک شیر خودش سالم باشد و علایمی از بروز بیماری را نداشته باشد.
- کارشناس بانک شیر بعد از رسیدن شیر به بانک شیر، ابتدا دست های خود را با آب و صابون با روش استاندارد شسته و شیر را تحويل بگیرد. از اسپری کردن مواد ضد عفونی کننده به سطح خارجی ظرف شیر پرهیز شود چون ممکن است مواد ضد عفونی کننده وارد شیر شود.
- ظرف یکبار مصرف حاوی شیر، پس از استفاده دور انداخته شود.
- ظرف چندبار مصرف را می توان به طرز صحیح شست ، استریل نمود و دوباره استفاده کرد.
- کارشناس بانک شیر مادر بیمارستان ، باید از سلامتی اهدا کنندگان حاضر در بیمارستان اطمینان حاصل کند.

انتقال COVID19 از طریق شیر مادر

- انتقال COVID19 از طریق شیر مادر یا به طور عمودی از طریق جفت غیر محتمل است. مطالعات محدودی که در طی دو ماه گذشته انجام گرفته نشان داده است که در خون بدن تناف نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به COVID19 وجود ندارد. هم چنین بر اساس مطالعاتی که بر روی ویروس های مشابه نظر سارس و مرس انجام شده است نشان می دهد این ویروس ها در