

بیمارستان و زایشگاه

Bent al-hodah

ضمن آرزوی سلامتی امیدواریم مطالعه این پمفت آموزشی در افزایش آگاهی شما جهت آشنایی و پیشگیری از عوارض مفید باشد.

زایمان:

زایمان امری است طبیعی که معمولاً با همکاری مادر و فرد کمک کننده به زایمان انجام می شود. زایمان به دو روش طبیعی و سزارین انجام می شود.



زایمان به روش سزارین:

سزارین یک عمل جراحی بزرگ محسوب می شود و مانند سایر اعمال جراحی نیاز به اتاق عمل دارد. در این روش نوزاد از طریق برش جراحی که بر روی شکم و رحم داده می شود متولد می گردد.

مزایای زایمان طبیعی:

- در حین زایمان مادر کاملاً هوشیار است و در جریان روند زایمان قرار می گیرد.

- پس از زایمان طبیعی مادر سریعاً از سلامت نوزاد خود مطمئن می شود زیرا مادر هوشیار است و بلاfaciale نوزاد را می بیند.

آدرس: مشهد، خیابان بهار

تلفن: ۵۱۳۸۵۹۰۵۱

www.bentolhodahospital@yahoo.com

کanal تلگرامی: @benthospital

- در زایمان طبیعی چون فاصله بین زایمان و شروع اولین شیردهی کوتاهتر می باشد مادران در تداوم شیردهی موفق ترند.
- در برقراری ارتباط عاطفی با نوزاد خویش موفق تر از مادران سزارینی هستند.
- حجم خونی که مادر در زایمان طبیعی از دست می دهد تقریباً نصف سزارین است.
- درصد ابتلاء مادران به عفونت خیلی کمتر از سزارین است.
- خطرات عمل و عوارض بیمهوشی در زایمان طبیعی وجود ندارد.
- طول مدت بستری و بازگشت به کارهای روزمره خیلی کمتر از سزارین است و مادرانی که زایمان طبیعی دارند خیلی زودتر به محیط خانواده باز می گردند.
- از نظر اقتصادی زایمان طبیعی به نفع مادر، خانواده، بیمارستان جامعه می باشد.
- تناسب اندام خود را با انجام ورزشهای بعد از زایمان خیلی سریعتر از مادران سزارینی بدست می آورند.

۱- در خانمهای سزارینی، احتمال سزارین
های بعدی افزایش می یابد.

۲- اختلاف خلقی مادر مثل افسردگی در این
مادران بیشتر از مادرانی است که به صورت
طبیعی زایمان داشته اند.

۳- احساس ترس و نگرانی از حاملگی بعدی در
این مادران بیشتر از مادرانی است که به صورت
طبیعی زایمان داشته اند.

۴- این مادران نمی توانند یک ارتباط عاطفی
مناسب و زود هنگام با نوزادشان داشته باشند
(علت حالت بیهوشی و درد زیاد بعد از عمل).

۵- داروهای بیهوشی باعث احساس خستگی
خواب آلودگی به مدت طولانی تری در مادران
سزارینی شده و همچنین این داروها در
بیهوشی طولانی مدت بر روی جنین نیز
عوارضی دارد.

۶- طول مدت بستری در بیمارستان در مادران
سزارینی بیشتر است و در نتیجه هزینه

BENTOLHODA HOSPITAL

اقتصادادی بیشتری دارد.

۷- احتمال عفونتهای ادراری در سزارین به علت ضربه و صدمه
ای که به سیستم ادراری در حین عمل وارد می شود بیشتر است.

۸- احتمال ایجاد بیوست به علت استفاده از داروهای بیهوشی و
کم تحرکی (به علت درد های پس از سزارین) در این مادران
بیشتر است.

۹- این مادران به علت حالت بیهوشی و دردهای پس از عمل قادر
به شروع شیردهی به موقع نخواهند بود که این امر باعث می شود
طول مدت شیردهی کاهش یابد.

۱۰- احتمال ایجاد مشکلات تنفسی در نوزادانی که به طریق
سزارین متولد شده اند نسبت به نوزادان متولد شده به روش
زایمان طبیعی بیشتر است.

نکته:

سزارین تنها در موقعي کاربرد دارد که زایمان طبیعی برای مادر و
جنین با خطر همراه باشد. در این موارد بایستی به توصیه های
پزشک و مامای معالج خویش عمل نمود. در غیر اینصورت تمامی
مادران قادرند یک زایمان کاملاً طبیعی و ایمن داشته باشند.

- در صورت کنترل سزارین ناجا در کشور، می توان از مرگ
مادران و نوزادان به میزان قابل توجهی کاست.