




آپاندیسیت

کمیته آموزش به بیمار

آموزش به مددجو
منبع:
پرستاری داخلی
برونز سودارت
uptodate



آدرس: مشهد - خیابان بهار | تماس: ۰۵۱۳۸۵۹۰۰۵۱

© bimarestan.zayeshgah.bentohoda.com | www.bent-hospital.com

- پس از ۲-۴ روز استحمام بلامانع است پانسمان ناحیه عمل را طبق نظر پزشک معالج برداشته و به حمام بروید. ازاین پس ناحیه عمل نیاز به پانسمان ندارد مگر اینکه پزشک معالج شمادستورداده باشد.
- به مدت دوهفته از انجام کارهای سنگین خودداری نمایید. پس از این مدت می توانید به فعالیت های طبیعی و روزمره خود ادامه دهید.
- البته در مواردی که شکم به نوع دیگری باز شده باشد و یا مواردی که زخم باز باشد زمان شروع فعالیت کمی به تعویق خواهد افتاد و لی کلام محدودیت حرکت در این جراحی زیاد نیست و شمامی توانید باشکم بندکشی به کار روزانه خود بازگردید و پس از مدتی نیز به شکم بند احتیاج نخواهید داشت.

در صورت بروز علائم زیر به پزشک یا اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.

- قرمزی، تورم و ترشح از محل عمل
- تب و لرز
- نهوع و استفراغ
- نفخ شدید

کلینیک پرستاری آموزش سلامت

همه روزه ۸ الی ۱۴

شماره تماس: ۰۵۱-۳۸۵۹۰۰۸۵



- پس از جراحی هیچگونه محدودیتی در مصرف مواد غذایی ندارید ولی باید تاحدامکان از مواد پروتئینی مانند ماست، گوشت و میوه جاتی که حاوی ویتامین ث بیشتری می باشد استفاده کنید و از خوردن غذاهای نفخ و پرخوری پرهیز نمایید.
- بعد از جراحی آپاندیسیت، ممکن است در ادرار کردن مشکل داشته باشید که با گذاشتن کیسه آب گرم و یا سوندراز موقت مشکل شما حل می شود.
- پانسمان ناحیه عمل ۲-۳ روز بعد از ترخیص بیمارستان تعویض شده و ناحیه عمل توسط پزشک و پرستار کنترل می شود. حتما طبق تاریخ کارت ۷-۵ روز بعد از عمل، به پزشک مراجعه نمایید.

مددجوی عزیز

چه مراقبت های لازم است پس از جراحی انجام شود؟

- پس از عمل و به هوش آمدن به شما داروهای مسکن و آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک معالج داده خواهد شد . تلاش کنیدتا داروها را بطور صحیح و در زمان مشخص مصرف نمایید.
- یکی از عوامل موثرتر تسریع بهوبدی شما بعد از عمل راه رفتن می باشد که باید مرتب آن را انجام دهید.
- در صورت مشاهده هرگونه تغییر در محل عمل جراحی مانند قرمزی ،تورم و التهاب فوراً به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.
- داروهای تجویز شده توسط پزشک را در منزل طبق ساعت های دستور داده شده بطور دقیق مصرف نمایید.



آپاندیس چه علائمی دارد؟

درد ناحیه تحتانی راست شکم

- کاهش اشتها
- استفراغ
- تهوع
- نفخ شکم

وقتی دچار تب ، تهوع یا درد شکم هستید نباید ملین (کارکن) یا مسکن بخورید.

چگونه آپاندیسیت تشخیص داده می شود؟

- انجام معاینه بالینی توسط پزشک
- انجام آزمایش خون و ادرار
- انجام رادیوگرافی و سونوگرافی شکم

آپاندیسیت چگونه درمان می شود؟

درمان بیماری غالباً جراحی است که آپاندیس به وسیله جراح به روش لایپراسکوپی (بسته) و یا باز برداشته می شود. برداشتن این زائد ملتهب هیچگونه مشکلی را برای شما ایجاد نمی کند و لی ماندن آن در شکم بسیار خطناک بوده و معمولاً توسط جراح برداشته می شود.

باسلام و آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم از لحظات که در کنار شما بودیم رضایت کاف داشته باشید این پمقلت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد بیماری و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است.

آپاندیس یک زائد کوچک انگشت مانند باطولی در حدود ۰ اسانی متر می باشد که در درون شکم انسان قرار دارد. این زائد بطور پیوسته از غذا پر و تخلیه می شود. از آنجا که این زائد بطور کامل تخلیه نمی شود و قطر آن کوچک می باشد لذا مستعد عفونت و انسداد است. آپاندیسیت به معنی التهاب آپاندیس بوده که شایعترین علت درد در قسمت تحتانی راست شکم می باشد.