

سرطان ریه

آزمایش غربالگری **PSA** را برای سرطان پروستات انجام دهید
معاینات منظم دوره ای رکتوم را انجام دهید.

سیگار و الكل مصرف می کنند بیشتر است.

سرطان ریه شایعترین سرطان در آمریکا بوده و علت عمدۀ مرگ ناشی از سرطان در مردان است. از هر ۱۰ مردی که در اثر سرطان ریه فوت می کند ۹ نفر آنها سیگاری بوده یا در معرض دود زیاد سیگار بوده است.

سرفه های دراز مدت و همراه با خون را جدی گرفته و به کادر درمانی اطلاع دهید. سیگار را ترک کنید. در صورت نیاز می توانید از مشاورین مربوطه کمک بگیرید.

سرطان پروستات

سرطان بیضه مردان میانسال و جوان را گرفتار می کند. و در مردانی که سابقه عدم نزول بیضه در بچگی را دارند، بیشتر است.

معاینه ماهانه بیضه ها در حمام انجام داده و از نظر وجود توده و تغییر در اندازه بیضه ها بررسی کنید.

در صورت احساس توده، تورم، سنگینی در بیضه ها، درد در قسمت تحتانی شکم و کشاله ران به کادر درمانی اطلاع دهید.

گرفتگی و تغییر صدا را جدی گرفته و به به کادر درمانی اطلاع دهید.

الكل و سیگار را ترک کنید. در صورت نیاز می توانید از مشاورین مربوطه کمک بگیرید.


سرطان حنجره

سرطان حنجره در مردان ۷ برابر شایع تر از زنان است. معمولاً در سنین ۵۰-۶۰ سالگی رخ می دهد. در مردانی که زیاد



بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

سرطان های مردان



بیمارستان بنت الهدی

✿ س احتمال بروز سرطان پوست با قرار گرفتن در معرض نور شدید خورشید، پرتو درمانی و اشعه ماوراء بنفس افزایش می یابد.

✿ زمانی که در معرض نور شدید خورشید قرار دارید از کرم های ضد آفتاب استفاده کنید.

✿ آزمایشات غربالگری سرطان پوست را انجام دهید.

✿ پوست را از نظر تغییر در اندازه و رنگ خال و برآمدگی بررسی کنید.

منبع مورد استفاده:

<http://www.MD Consult.com>

سرطان کولورکتال (روده بزرگ)

این سرطان معمولاً در مردان بالای ۵۰ سال بروز می کند. احتمال بروز آن در مردانی که سابقه فامیلی سرطان کولون و رکتوم، کولیت زخمی شونده یا سایر مشکلات روده ای را دارند، بیشتر است.

✿ هر گونه تغییر در عادات روده ای و تغییر در اجابت مزاج را به قادر درمانی اطلاع دهید.

✿ از غذاهای کم چرب، سرشار از فیبر و کم گوشت استفاده کنید.

سرطان پوست

بیشتر سرطان های پوست در سنین بالای ۵۰ سالگی رخ می دهد. در افرادی که چشم ان آبی، موهای بلوند و بور و پوست روشن دارند، شایع تر است.