



کولہ سیستکتو می (برداشتن کیسہ صفر ۱)

INDIA HOSPITAL

HOSPITAL

15

بیمارستان و زایشگاه بنت‌الهدی

کولہ سستکتو می

شماره سند: ۱۳۹۶-۰۷-۲۴ - شماره ویرایش: ۱۰ - شماره
پذیرفته: ۱۰ - تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰-۰۷-۰۱

آدرس: مشهد- خیابان بهار | تماس: ۰۵۱۳۸۵۹۰۰۵۱

© bimaresfan.zayeshgah.benfolhoda  www.bent-hospital.com

علائم عفونت زخم شامل: افزایش حساسیت، ترشح چرکی، تورم و قرمزی زخم، تب خفیف می باشد. در صورت مشاهده به پزشک مراجعه کنید.

بعد از جراحی از بلند کردن اجسام بیش از ۲/۵ کیلوگرم تا ۱ هفته خودداری فرمائید.

عواض بعداز عمل جراحي:

۱-درد شانه:

اسعاده نماید، اهتماد، کمک مو، کنند، دس بخت ازین، ترود.

۲- احتمال ایجاد عفونت:

درو محل زخم، در ریه ها

۳-احتمال ایجاد ترومبوز(لخته خون در مسیر رگ ها) عروق وریدی:

بدنبال جراحی های لایاروسکوپیک این حالت بیشتر دیده می شود در این حالت احتمال ایجاد لخته در عروق خونی محیطی و انعزال با عروق مرکزی وجود دارد.

برای جلوگیری از این حالت بیمار باید بعداز عمل هرچه سریعتر شروع به آه، فته، نمایند.

۴- در موارد بسیار کمی ممکن است تکه کوچکی از سنگ وارد مجاری صفرایی گردد که اغلب از آن عبور کرده و خطری ندارد. در موارد بسیار نادری نیاز به روش های درمانی یا جراحی دوم می باشد.

کلینیک پرستاری آموزش سلامت همه روزه ۸ الی ۱۶

شماره تماس: ۰۵۱-۲۸۵۹۰۰۸۰

روی محل بخیه ها پانسمان کوچکی قرار داده می شود که باید خشک نگه داشته شود. بعد از ۳ روز پانسمان را بردارید.

-فعالیت روده های بیمار ممکن است تا ۳۰ روز بعد از عمل دیده نشود. در صورتیکه بیش از ۷۲ ساعت بعد از عمل فعالیت روده ای دیده نشد با پیشک خود مشورت کنید. نیاز به محرف ملین ممکن است وجود داشته باشد.

-معمولاً ۲ هفته بعد از عمل لایار اسکوپی و ۴ هفته بعد از عمل جراحی، باز فرد می‌تواند فعالیت‌های قبل خود را از سریگیرید.

-داروها را طبق دستور پزشک مصرف نمایید و در زمان گفته شده برای ویزیت مراجعت نمایید.

- معمولاً رانندگی فعالیتی است که بیمار در صورتی که بتواند روی صندلی ماشین بنشیند و کمربند را ببندد می‌تواند آغاز کند. این حالت ۲ هفته بعد از جراحی لایاراسکوپی و ۳ هفته بعد از جراحی باز اتفاق می‌افتد.

-در صورتی که زخم بیمار ترشح ندارد ۳ روز پس از ت وخیص از بیمارستان می تواند استحمام نماید.

در صورتیکه درداداشتید می توانید از داروهای مسکن با تجویز پرشک اسقفاًده کنید.

-ممکن است پس از عمل لوله ای در شکم قوار داده شود تا
ترشحات را تخلیه نماید که معمولاً چندروز بعد از عمل پس
از دستور بیرون آورده می شود.

-برخی بیماران بعد از عمل احساس تهوع دارند که نگران
کننده نیست و با مصرف دارو بهبود می یابد.

مددجوی عزیز

بسلام و آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم از لحظاتی که در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و این یمقلت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد بیماری و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است.

کوله سیستکتومی:

کیسه صفرا ارگانی از بدن است که وظیفه ذخیره و غلیظ کردن صفرا را بر عهده دارد. مایع صفرا جهت هضم غذاهای حاوی چربی موردنیاز است. مجاری صفرا ای مسیرهداشت صفرا از کبد به روده می باشد.

سنگ های صفرا بیشتر به دلیل به هم خوردن تعادل شیمیایی صفرا ایجاد می گرد.

سنگ های صفراوی اغلب "آنوع هستند:

۱- سنگ کلسترولی

۲- سنگ پیگمانته مخلوط کلسترول و پیگمانته درصورتی که خروج صفرا را مسدود کند درد ایجاد می گردد. سنگ های کلسترولی در زنان ، افراد بالای ۴۰ سال، افراد چاق و کسانی که از داروهای ضدبارداری خوراکی استفاده می کنند بیشتر دیده می شود.

علائم و نشانه های بیماری:

یک یا چند علامت ممکن است وجود داشته باشد:

- درد مبهم در ربع فوقانی راست شکم که از چند دقیقه تا چند ساعت دیده می شود.

- عفونت کیسه صفرا

- زردی همراه با خارش شدید پوست و مخاط

- ادرار تیره و مدفع خاکستری رنگ

- کمبود ویتامین های محلول در چربی (A - D - E - K)

- تهوع و استفراغ

- بی اشتها بی

تدابیر درمانی:

- بیماران باید جهت کاهش درد رژیم غذایی کم چربی را رعایت کنند

- رژیم غذایی پرپروتئین و پرکربوهیدرات توصیه می شود.

- خوردن تخم مرغ، غذاهای غنی از چربی، سبزیجات نفخ و ایجاد کنندگه گاز ممنوعیت دارند از پرخوری پرهیز کنند.

- معمولاً ۳-۶ ماه طول میکشد تا بیماریهای غذاهای چرب تحمل پیدا کنند

- داروهای خوراکی معمولاً فقط در نوع لجن کلسترولی کمک کنند و به درمان سنگ صفراوی هیچ کمکی نمی کنند.

- برداشتن کیسه صفرا به روش جراحی باز یا لایاراسکوپی انجام می شود.

مراقبت های بعد از عمل جراحی:

- معمولاً بعد از عمل بسته گسوراچ کوچک روی سطح شکم دیده می شود که به وسیله بخیه های ظریفی دوخته شده است. حدوداً

یک هفته بعد از عمل جراحی بخیه ها باید با دستور پزشک کشیده شود. (ممکن است بخیه ها جذبی باشند)

